

簡明中西匯參醫學圖說

叙醫學一道大約中醫以理勝西醫以
二考固未嘗不一以貫之也雖然
太史公傳扁鵲曰視見垣一方人以
此視病盡見人五臟癥結西國研
剖鮮諸法加以圖表亦令人盡見
臟癥結是答之以扁鵲生
函醫不哭駕中醫學歷二
君蓋臣究心醫學歷二十餘年
精求西國理化學於醫學一門尤

別有心得今歲春應上海書局之聘
出所編中西匯纂醫學圖說一書
究詳攷伸以辨論附之以方藥亦
簡當亦精博編既成問厚於余余
懵不知醫而開是編覺中西之理
備即醫家之功用全行見壽人臣
蓋臣其以是編券之哉爰艸數言
不質諸藎臣其以余言爲不謬不
光緒三十三年仲夏月四日
郭謙益題

自秦西通中國而吾人知研究實學者當今之
急務以一製造必先考物質一種植必先辨土
宜此俱非向之驚惑者之所為也況醫學者為
人性命之所關憑空結構安知不失之毫釐差
以千里故昔人云醫者意也今以知意想之無
憑不若目覩之有據嘗觀西醫視疾遇疑難不
治必剖解其肢體以得其病之所在由是而繪
諸圖著諸論俾後之治是疾者遂百年而有維
鑒之證佐吾友王君蓋臣讀書之暇潛心醫學
垂二十寒暑矣脉理之精與藥性之細微無不

參詳以至於盡近又於西醫實學頗有心得
是舉中國之虛者以西法實之其難明處悉取
圖以顯其形其須辨處亦借論以闡其理顏生
書曰簡明中西匯參醫學圖說編既成以示余
余曰方今實學黜見之時君此書出而餉諸同
好謂為救醫界中之虛獎可也即不僅謂為救
醫界中之虛弊亦可也茲當石印告成因不揣
謏陋而書數語於簡端

光緒三十二年丙午之歲夏月

古董周學銓書於滬寓

中西滙參醫學圖說序

天生萬物人為最靈人之生也必有其所以生即當知其所以病知其所以病即當知其所以治則醫尚焉今世界中人顧多忽焉不察至病既作始知延醫又或付性命於庸醫之手甘心就死何其以最靈之人而為此最愚之事不亦大可痛哉余有鑒於此已二十餘年矣研究中國醫書知病之有虛實寒熱藥之有補瀉溫涼靡不遞加審察是以遇內外諸症輒獲奇效近數年間精求西國格致之學於醫學一道更覺隱合鄙意觀其剖解之法及繪畫之圖悉皆毫

髮不爽現聘精於西畫者繪成人體分合各圖計五十餘幅每幅繫以醫藥鍼灸之法令人見之一目了然則人之所以生所以病與夫所以治者病家之原委醫家之理由當不難取資於是書矣余初編是書亦祇為自勉之計非敢問世也今歲春吾友章君佐卿見而題之謂是書大有裨益於世盍付石印以公同好余維章君有濟世之心何敢方命書既成因不揣鄙陋而為之序

光緒三十二年丙午歲仲夏月四明王有忠自序於

中西滙參醫學圖說

浙江鄞縣

王有忠蓋臣氏編輯
章秉鉞佐卿氏校閱

例言

一是編以陰陽為大綱以十二經為支目綱既舉而目自張蓋病由臟腑而生不外虛實寒熱諸症審知其何臟何病則用鍼用藥各適其當治一病可治百病亦無不可故不多立病名多立方藥也

一是編先列人體及各臟分合之圖次及十二經手足三陰三陽穴圖令人一目了然按圖可索

一用藥如用兵故於補瀉溫涼之中有猛將次將之比俾閱者不至輕用而貴善用江涵暉先生著有醫鏡

一書最為善本茲擇其要而畧增之

一中西論臟腑表裏各有所主惟近時劉鍾衡先生著有中西滙參銅人圖說一書議論簡當中外融通

擇論說歌括均入卷內洵為衛生有用之書

一陰陽生尅氣血運行有非西法剖驗所能明者則以中醫論說為定蓋取西人之詳於形迹取中醫之詳於功化也

一鍼灸穴法淺深分寸悉依銅人鍼灸圖為準的其餘概不贅述

一中醫有於五臟外添膽中一說按膽中即包絡也西醫謂心處胸中周圍有隔膜裹之亦言心包絡也膽中之說似屬可省

一西醫添甜肉一經但言其形莫詳所用按稼穡作甘定儒於脾可無疑義

一是編為衛生家言精究詳致而歸於簡明但見現何病象即用何法治之雖寥寥數語自能盡知底蘊其一切病源方藥亦畧掛一二

一是編注重衛生表列圖像惟辭句間有未加修削蓋急就章也閱者諒之

光緒三十二年五月編者識

簡明中西滙泰醫學圖說

上編目次

全身血脈筋肉及內臟配布位置圖

神經圖

仰人會脈圖

伏人會脈圖

週身血脈總管圖

血脈管說

腦圖

全身脈管圖

全身腦氣筋論畧

週身血脈管圖

脈論

全身筋肉圖

正面人骨圖

全身骨數考

心肺合圖

心肺合說

脾胃合圖

脾胃合說

肝膽合圖

肝膽合說

腎與膀胱合圖

腎與膀胱合說

大小腸合圖

大小腸合說

仰人經圖

伏人經圖

臟腑合圖

手太陰肺經圖

肺經諸穴歌

手太陰肺經考正穴法

肺臟圖

手太陰肺經主治

肺部藥隊

手陽明大腸經圖

手陽明大腸經考正穴法

大腸諸穴歌

大腸腑圖

手陽明大腸經主治

大腸部藥隊

足陽明胃經圖

足陽明胃經考正穴法

胃經諸穴歌

胃腑圖

足陽明胃經主治

胃部藥隊

足太陰脾經圖

足太陰脾經考正穴法

脾經諸穴歌

脾臟圖

足太陰脾經主治

脾部藥隊

手少陰心經圖

手少陰心經考正穴法

心經諸穴歌

心臟圖

手少陰心經主治

心部藥隊

手太陽小腸經圖

手太陽小腸經考正穴法

小腸諸穴歌

小腸腑圖

手太陽小腸經主治

小腸部藥隊

足太陽膀胱經圖

足太陽膀胱經考正穴法

膀胱諸穴歌

膀胱及生殖器圖

陽精論

陰精論

足太陽膀胱經主治

膀胱部藥隊

足少陰腎經圖

足少陰腎經考正穴法

腎經諸穴歌

腎臟圖

足少陰腎經主治

腎部藥隊

下編目次

手厥陰心包絡經圖

手厥陰心包絡經考正穴法

心包絡經諸穴歌

心包絡圖

手厥陰心包絡主治

手少陽三焦經圖

手少陽三焦經考正穴法

三焦諸穴歌

三焦腑圖

手少陽三焦經主治

三焦部藥隊

三焦經說

足少陽膽經圖

足少陽膽經考正穴法

膽經諸穴歌

膽腑圖

足少陽膽經主治

膽部藥隊

足厥陰肝經圖

足厥陰肝經考正穴法

肝經諸穴歌

肝臟圖

足厥陰肝經主治

肝部藥隊

任脈圖

任脈考正穴法

任脈諸穴歌

督脈圖

腎脈考正穴法

腎脈諸穴歌

奇經八脈圖

奇經八脈歌

回陽九針圖

回陽九針歌

胎圖

胎論

橫生圖

難產說

救難產法

下針八法

神針八法

十二字分次第手法及歌訣

雷火神灸

仰面尺寸圖

伏面尺寸圖

中指同心寸圖

十四經脈長短尺寸圖

皮膚斷面圖

用艾灸法

艾灸補瀉

艾炷大小先後

灸瘡要法

灸瘡膏法

洗灸瘡法

壯數多少

灸後調攝法

切脈秘旨

治婦人脈四言詩

小兒驗紋按額診脈四言詩

小兒面部五位圖

命門部位歌

附傳小兒初生拔毒奇方

備用諸方

補中益氣湯

獨參湯

二陳湯

三生飲

四君子湯

五苓散

六味地黃丸

七福飲

八珍湯

九味羌活湯

十全大補丸

一柴胡湯

二冬湯

三黃解毒湯

三化湯

四味香薷飲

四苓散

四逆湯

四生丸

五皮飲

五痿湯

五味異功散

六君子湯

香砂六君子湯

七珍散

七味安神丸

加味七神丸

八味地黄丸

知柏八味丸

加味八珍湯

生地八物湯

十補丸

百藥煎散

人參燕窩百全湯

左歸飲

右歸飲

大承氣湯

小承氣湯

大柴胡湯

小柴胡湯

大陷胸湯

小陷胸湯

搐鼻散

補天大造丸

治痢奇方

通音煎

開嚔散

香蘇散

平胃散

手拈散

滾痰丸

小半夏加茯苓湯

越鞠丸

逍遙散

葛根湯

牛黃丸

附子理中湯

益元散

藿香正氣丸

茵陳大黃湯

茵陳薑附湯

蠲脾湯

桂枝湯

麻黃湯

柴葛解飢湯

白虎湯

白通加猪胆汁湯

止嗽散

團魚丸

月華丸

生地黄湯

人參養榮湯

秘精丸

澤蘭湯

補天大造丸

普濟消毒飲

神朮散

朴黃丸

止癰丹

和中丸

白朮丸

金匱腎氣丸

秘旨安神丸

歸脾湯

安神定志丸

洋參麥冬湯

清心丸

清膈煎

沉香降氣散

化蟲丸

薑附湯

導赤散

瀉心丸

生鐵落飲

草薢分清飲

阿膠散

甘露飲

柴胡疎肝散

瓜蒌散

清空膏

芍藥甘草湯

奔豚丸

橘核丸

橘皮竹茹湯

煖肝煎

蟬花無比散

柴苓煎

消瘰丸

五痿湯

歸芍六君子湯

大和中飲

大無神功散

香砂二陳湯

蒼白二陳湯

保和丸

木香丸

滋腎丸

枳朮丸

和胃飲

玉女煎

抽薪飲

犀角大青湯

安胃飲

加味升麻湯

溫胆湯

推氣散

桔梗湯

瀉白散

茜根湯

犀角地黄湯

黃芩知母湯

黃芩清肺飲

生地黃煎

玉母桃

香砂理中湯

黃芩芍藥湯

加味枳朮湯

葛花清脾湯

梔子蘼皮湯

桔梗前胡湯

加味甘桔湯

貝母瓜蒌散

紫苑散

鴉胆子

清魂散

通關散

益母勝金散

獨聖散

龍膽瀉肝湯

脫花煎

歸薑湯

花燕石散

生化湯

神仙太乙膏

解恨煎


贊育丹

毓麟珠


全身血脈筋肉及內臟配布位置圖



神經圖



仰人會脈圖



伏人會膠圖

會膠筋穴在背第七椎下
 筋會陽後泉
 筋會大行 兩骨各一寸五分筋筋之血會
 筋會大行 從筋筋筋之下
 筋會之所


筋會大行
 筋會大行
 筋會大行
 筋會大行

筋會大行
 筋會大行
 筋會大行
 筋會大行

筋會大行

全體脈管圖

1 心臟
2 肺臟
3 肝臟
4 脾臟
5 腎臟
6 甲狀腺



血脈管說


血脈管者。運行赤血之管也。其徑常圓。本體三層。內層薄滑。中層畧厚。色黃質軟。自能舒張。外層紋理交結。總管及入肺管近心處均有三門。形如牛扇門閉之狀。微窩向上。門邊正中。有脆骨一粒。品字相對。如芝麻。以三圓相並。當中必有漏處。故生三粒以補之。門後管體有小孔。血少許。使門不粘於管。以助開閉之機。心血過此。可出而不可入。其總管由心左下房生出。直插上房而上。約二寸許。即迴屈而下。彎作一拱。下至膈膜。分佈小枝入左右兩脇。透過膈膜。分布大枝。散行臟腑之

間至腰下第四節。即分歧為二。散佈小枝。密纏股足
 之間。其拱之上。又生三大支。左二右一。右支約寸許。
 復歧分為二。一由頸右達腦。一由右肩達手。其左二
 支。一由頸左達腦。一由左肩達手。皆散佈小枝密纏
 於內。週身骨肉。無處不到。支上生枝。髣髴如樹。各處
之旁支。上下互相通連。正○迴血管者。迴導紫血入
支。雖塞。血脉可從旁運也。心之管也。管內有門。門無定位。頭腦臟腑之間。皆無
更其體比脈管稍薄。脈管受厚薄不同。其徑稍寬有
 血則圓。無血則扁。總管二支。由心右上房而出。一支
 向下。以接下身臟腑兩足之迴血。一支向上。以接上

身頭腦兩手之迴血。散佈小支。如血脈管之狀。但脈管深居肉內多。而迴血深淺皆有。藍色無脈者是。又另有一種。名微絲血管。一寸測管約有二目力不見。以鏡顯之。見密結如網。骨肉內外通體皆然。其有血。與血脈管迴血管兩尾相通。故赤紫兩血通行無礙。血脈迴血兩管其頭在心相通其尾在微絲管相通

腦圖

1 嗅神經
2 視神經
3 大腦



4 小腦
5 延髓

週身血管圖



人身血管根生於心如樹之有枝有幹
不論百體內外一氣流通與迴血管並
行氣血由是以相出入

全身腦氣筋論畧

凡百體中最要而最靈者。厥惟一腦。一切知覺思慮。皆所從出。而運動施為。亦所必賴。百體功用。相稱相和。不犯不害。各隨其分者。皆賴腦為主。其主百體者有三。一腦髓。一脊髓。一腦筋。三者皆分列體中。考脊髓分出之腦筋。共有三十一對。即在頸八對。在背十二對。在腰五對。在胸六對。各對由前後二根起。兩合相外。又分前後兩條。前條專司運動。後條專司知覺。愈分愈細。計白腦絲。每寸可列一千五百條。至一萬一千條。每條外有白質鞘。中有軸。曰腦筋軸。或貫

八腦結。腦珠。腦筋。佈散體內。粗者為筋。由筋分線。由
線分絲。有繞如網者。名腦網。有聚如珠者。名腦珠。有
結成結者。名腦結。結之大者。名腦積。質皆白灰色。以
顯微鏡觀之。中有灰白二絲。積絲成線。積線成筋。白
線多於灰線。故白質亦多於灰質。推在腦中。則灰質
多於白質。

週身血脈總管圖



脈論

脈者。醫之關鍵。醫不究脈。則無以辨證。內經歷周秦漢魏。鮮有知其旨。錯者。至晉王叔和始以醫鳴世。撰有脈經。可謂詳切。措其大小。腸候之兩寸。無非經絡相表裏。於診候部位。似乎至下之腑。診至上之部位。故古今醫統。辨其所誤。惟內經以心配臍中。肺配胸中。肝配臍。脾配胃。兩尺外以候腎。內以候腹中大小腸膀胱三府。理有可據。義亦相通。近代湘鄉周夢覺先生。著有三指禪一書。二斗七脈中提一緩字為平脈。其餘悉從對待辨出脈象。卓見所及。洵為空前絕。

後醫門可奉為津梁者也。西人脈形計分十種曰浮沉遲速壯弱大小柔硬。謂人身血脈發源於心。運行百體而總入於肺。接吸生氣。由肺復返於心。日夜輪流不息。每小時運行四十週。以一日夜二十四小時計之。運行四百八十週。人人皆然。脈至踴動。乃心經發血之力。一發為一至。遍體同時湧應。一脈統驗週身之病則可。某部之脈。獨決某經之病則不可。意以五臟六腑。何偏繫於寸許之管。不知中國古人創立脈法。已先自為問難。經曰。十二經中皆有動脈。獨取寸口以決五臟六腑。以及陰陽死生之法。何謂也。然

寸口者。脈之大會。手太陰之動脈也。人一呼。脈行三寸。一吸。脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。人一日一夜。凡一萬三千五百息。脈行五十度。週身營衛。行陽二十五度。行陰二十五度。為一週。復會於手太陰寸口者。五臟六腑之所終始。故取法於寸口也。從關至尺。是尺內陰之所至也。從關至魚際。是寸口陽之所治也。上部法天。主胸以上至頭之有疾也。中部法人。主膈以下至臍之有疾也。下部法地。主臍以下至足之有疾也。又曰。上竟上者。胸喉中事。下竟下者。少腹腰股膝脛足中事。蓋兩寸心與肺。既統周身。脈管流行。

貫通為脉之都會。又分寸為陽。尺為陰。陽外陰內。天地不易之理。凡主表主上主氣屬陽者。皆診於寸。主裏主血主下。屬陰者。皆診於尺也。

全身筋肉圖




正面人骨圖

胸骨
肋骨

頸骨
肩胛骨
脊骨
上膊骨
鎖骨
腕骨

大腿骨
趾骨
趾骨


腕骨
掌骨
指骨
膝蓋骨
腓骨
脛骨



全身骨數考

全身之骨計共二百塊。頭骨八。面骨十四。脊骨二十四。鈞骨一。尾骨一。脇骨二十四。胸骨一。舌骨一。鎖柱骨二。肩胛骨二。臂骨二。正肘骨二。轉肘骨二。手腕骨十六。手掌骨十。手指骨二十八。無名骨二。大腿骨二。小腿骨二。輔腿骨二。膝蓋骨二。脚腕骨十四。脚掌骨十。脚指骨二十八。外尚有耳中小骨六。牙齒骨二十二。不在數內。

心肺合圖



1 心
2 左心室
3 右心室
4 肺
5 肺管
6 肺血管

心肺合說

心者。君主之官。神明出焉。人身知覺運動。無一不本於心。故百體皆臣。而心為君也。位據胸中。左右皆肺。周圍所裹之隔膜。名心包絡。相心布令。故為臣使之官。居於膈膈之中。又名膻中。心色赤而鮮。下尖上潤。外體圓滑。內空如囊。當中有直肉隔之。稱為左房右房。左右半截之間。有橫肉間之。稱為上房下房。四房大小相若。均有血管與肺相通。難經謂心主血。肺主氣。血為榮。氣為衛。相隨上下。榮行於內。氣發於外。所以心肺相關。肺內受病。氣管壅塞。心血亦窒礙不行。


若心房受病。肺經即呼吸喘急。如哮喘之症是也。經
曰。肺者相傳之官。治節出焉。因其夾輔心君。主行榮
衛而存過化之神者也。位居諸臟之上。體窩向內。中
夾有心管。血脈總管隔之。質輕而鬆。週圍有夾膜裹
之。狀若懸磬。系以氣喉。色如緇映紅。錯雜相間。葉右
三左二。披離下垂。後面豐圓。粘附背骨。前邊利薄。逼
近胸堂。并左右兩肺頂尖而圓。畧出首肋之上。底窩而潤。
貼承膈膜之皮。右肺大於左。因心尖向左。微占其位。
左肺長於右。緣肝體居右。稍高於脾故也。大概胸堂
潤者。其肺必大。凡呼吸之時。胸肋舒張。膈膜鼓動。諸

臟相隨以應之。膜沫濡潤以助之。剖割肺體。見有痰沫在內。拭去痰沫。便見管竅甚多。即難經所謂二十四孔也。凡人氣喉徑開五分許自吸門以下。脆骨共十五節。至二十節不等。前圓如玦。每節有韌膜相連。後平而氣。因與食喉逼近。長四寸許。分歧為二。在背脊第三節之前名曰氣管。左管約三寸許。斜入左肺裡窩之上。肺頂下二寸右管畧潤而短。約一寸許。橫入右肺之裏。由是大管分小管。漸分漸多。愈多愈微。密行兩肺之內。形如氣喉。節節有環。以微鏡顯之。見每管之末。皆有一圓薄氣胞。大小氣管。另有兩枝相附而行。一為赤血。數

緣其中皆生氣也。一為紫血支。緣其中有炭氣也。炭氣者。乃身體無用之物。雖化為氣。與養氣相合。其性有毒。與炭同類。故曰炭氣。凡人一呼一吸。合為一息。呼者。吐炭氣也。吸者。接生氣也。生氣入血則赤。炭氣入血則紫。生氣能養人。炭氣能殺人。故紫血入肺。運至氣胞之上。洩炭氣於胞內。氣管即通而出之。是為一呼。炭氣既出。復適生氣以入。直抵胞內。血隨攝之。是為一吸。呼吸不疾不徐。氣始舒暢。故屏息少頃。即怫鬱不安。必長嗟乃定。蓋赤血運行。必變紫血。紫血入肺。可吐炭氣。炭氣不出。衆血受病。凡有乳者。必有

肺有肺者必與水氣不合。如鯨鯢江豚之屬不能久潛潭淵。片刻之間須出水面以接生氣。蓋地上衆生有血者吸養氣而吐炭氣。草木之屬藉日暄而生者則攝炭氣而吐養氣。欲考其詳在乎西國博物志內。

脾胃合圖



1 脾
2 食道
3 贛門
4 胃膽
5 胃小腸
6 胃大腸
7 胃小腸
8 胃大腸
9 肝管
10 胆管
11 脾管
12 十二指腸

脾胃合說

脾胃者。倉廩之官。五味出焉。脾形如豎掌。居胃之左。在第九至十一肋骨之內。上半有膈肉蓋之。外邊豐圓向脇。內邊深窩向胃。窩中有稍壯發脉管入之。其內有迴血管。由胃後入肝。此管壅滯。即有血水滲洩於下。發為鼓脹。各臟腑皆以官名。推脾胃合一官。西人所謂消化器也。蓋胃主納穀。脾主消穀。二者相須成功。故統稱倉廩之官。五味出焉者。五穀備具五味。一入胃中。即化為汁液。從脾之油膜。散走五臟。由脾胃而達諸臟腑營衛也。西醫言脾右胃後。有甜肉一

條長約五寸。形如犬舌頭大。向右尾小。向左嘗其味甜。故曰甜肉。正中有汁液管。斜入小腸上口之傍。與膽管入小腸處同路。所生之汁如口津水。莫詳其用。亦不另立條目。胃形紆曲如袋。容水三升許。橫居膈下左方。肋骨護其半。頭大向左。賁門上連食管。尾小向右。幽門下屬小腸。其體三層。外層上下有養血管四支。分佈小支。密纏於內。因胃接血比他臟有更多。中層之肉有經緯兩紋斜交。故能舒縮擁動以勻轉食物。周圍有小穴以生津液。與百體相關應。胃本無化水之功。亦無出水之路。然茶酒入胃。少選即行攝。

去者。蓋腸胃有微絲血管甚多。按微絲血管。即華人三焦之屬。能吸攝茶水。由迴血管過肝入心。運行周身。由肺升出為氣。由皮膚滲出為汗。由內腎便出為溺。俱賴微絲管迴血管之運化也。

肝膽合圖



1 肝臟
2 肝膽
3 肝動脈
4 肝靜脈

肝膽合說

肝者將軍之官。謀慮出焉。肝居膈肉右方。其色赤。左

右兩葉。

前人論肝在左有七葉兩耳似手臆度

向上圓滿貼承膈肉。下

銳披離外凸內窩。右靠背而左枕胃。窩內橫隙。通

下部迴血合管以生膽汁。另有膽管二枝。一透小腸

頭。一透腹囊。切肝一臂以顯微鏡窺之。有紋如密葉。

每葉大如一黍。有迴血合管繞之。散佈小管於葉內。

與本體迴血管相通。又有血脉小膽管環之以養肝

體而接膽汁。故肝內分行者有四管焉。

生膽汁迴血合管本體迴

血管小膽管血凡肝有病最為要害。或肝體發大。或

肝內有熱。以致各管凝滯不通。使下部迴血壅脹。即有血水溢滲。腠膜之裏。漸漬漸深。終成蠱脹。經曰。膽者。中正之官。決斷出焉。繫右肝內旁之下。其汁乃下部迴血入肝所化。色綠味苦。主榨食物之津液。凡人食後。小腸飽滿。腸頭上通膽囊。使其汁流入小腸之內。以榨化食物。而利傳渣滓。西醫謂肝之為用。無他。主生膽汁而已。無關謀慮。膽乃肝液之囊。存貯其汁。以待用者。無關決斷。近時唐容川先生辨云。人身之陰陽。陰主靜。靜則有守。陽主動。動則有為。肝為厥陰經。乃陰之盡也。故其性堅忍而有守。厥陰中見少陽。

陰盡陽生。膽火居於肝中。陰中含陽。陽氣發動。謀慮從此而出。所以稱為將軍之官。故肝氣盛者。勇敢有為。肝氣虛者。每存懼怯。以肝膽二者合論。肝之陽從於陰。故主謀。膽之陽出於陰。故主斷。經云。五臟者。所以存精神。血氣。魂魄者也。六腑者。所以化水穀而行津液者也。西醫專以腦氣筋論人之質性賢愚。未知五臟皆有靈機。而司知覺運動。經言肝藏魂。魂者陽之精。氣之靈也。氣為陽。血為陰。肝主血而內含陽氣。是之謂魂。究魂之根源。生於坎水之一陽。推魂之功。用。發為乾金之元氣。故為將軍之官。肝屬木。如陽春

之發萌故曰謀慮出焉。經曰膽氣鬱為怒。諸臟之氣皆取決於膽。膽汁滿則氣壯。膽汁薄則氣餒。膽秉剛果之氣。故為中正之官。有膽量則有果斷。故曰決斷出焉。

腎臟
合圖



左腎
右腎
腎管
膀胱

腎與膀胱合說

腎者。作強之官。伎巧出焉。有左右兩枚。形與豬腰相似。腎位自背骨十二節至腰骨第三節。大小腸夾膜之後。左右相對。右腎畧大。上有肝腸蓋之。左腎畧長。上有脾胃蓋之。週圍有肥網包裹。膀胱者。州都之官。精液藏焉。位居兩胯骨盤正中。即前陰交骨之裏。其肉三層。內層牙黃色。軟有縐紋。中層肉理交結。外層即大小腸夾膜。體圓如盤。舒縮自如。無溺則縮。溺至則舒。積溺太多。則漲至臍上。內底有小孔斜接溺管。其上口與前陰相連。溺水出焉。西醫謂腎乃溺管脉

管迴管及筋膜互相疊裏而成。所謂腎系。即溺水血脉迴血三總管也。溺管直透腎內。成一溺囊。樣如酒漏。囊邊有尖角十二。頗類奶頭。每角有小管數十。直展如摺扇之形。每一小管直長三分許。迴曲分行腎邊。其上有微絲血管駕之。其末畧濶與脉管啣接。凡茶水入血。運行徧體。乃由血管導津液膺入內腎。運行腎裏。由管末滲漉以入。滲有未盡。復由微絲管攝入衆溺管。匯流而達溺囊。即出溺水總管。濺滴而下。斜入膀胱。故可入而不可返。是也。惟以腎為司溺專經。與精經迥不相涉。深斥華人左為正腎。右為命門。

男子藏精。女子繫胞之非。經言腎開竅於二陰。前陰為膀胱下口。膀胱者。腎之府也。腎主水。化氣化水。化氣上行為液。化水下行為溺。故前陰繫於腎竅。又前陰有精竅。與溺竅相附而殊途。溺竅內通於膀胱。精竅內通於胞室。為女子受胎。男子藏精之所。尤為腎之所司。故前陰有病。精竅者為瘡。有溺竅者為濁。後陰屬大腸下口為肛門。亦為腎所統司。腎液充腴。則肛門不結。腎氣能攝。則不脫肛。惟二陰皆屬腎竅。故經言腎為胃關。以飲食之質。皆從二陰出也。水道由腎。已詳前賢議論。惟西醫以腎司溺而不司精。則

徒明其體。未究其用。後世以水由小腸。下至關門。清者為溺。入膀胱。濁者為糞。入大腸。則兩失之耳。

大小腸合圖



1 小腸
2 大腸
3 胃
4 脾


大小腸合說

大腸者。傳道之官。化物出焉。分上中下三迴。由右膀骨倒行而上。上迴與小腸橫接。名曰關門。中迴在肝下橫過胃底。下迴至脾下。從左軟脇斜落。至肛門為直腸。合較大小兩腸。長於身六倍。上中兩迴。猶有精液管吸其餘液。遞傳渣滓。至下迴則精液竭矣。大腸所以能傳道者。賴肺氣下達。使小腸中物至此。精汁盡化。變為糟粕。理大腸者。必須調肺氣也。小腸者。受盛之官。化物出焉。週迴疊積。長一身有莖。上口通胃。下口橫接大腸。西醫考小腸百派千支。散佈腸後夾

膜之間與膜同色。細微難見。食後少頃。內有精液。始見如白絲然。夾膜有小核甚多。即吸管迴旋疊積所成者。一切吸管附近脊處。乃合為一名曰精液總管。附脊骨而上。至頸骨第七節。即屈轉而下。左入頸手迴血會管。直達於心。所以小腸食物由胃至小腸頭。為心之府。即與膽汁甜肉會合。漸落漸榨。榨如榨糖。榨出精液。榨油之榨。色白如乳。眾管吸之。初甚稀淡。漸入漸濃。運至會管。即混為血。小兒疳積症。乃吸液管受病。液核凝大。積閉不通。故多食猶瘡。按小腸上接於胃。凡胃所納之物。皆受感於小腸。西醫所謂附脊夾膜。即經言中焦

之物也。小腸通體。皆是油膜相連。其油膜中皆有微絲血管。通小腸以化食物。而物所化之精汁。即從膜中出小腸而達各臟。故曰化物出焉。其相通之路。則從油膜中之絲管。上膈達包絡以通於心。心移熱於小腸。則化物不出。為痢。為淋。脾陰不足。則中焦不能受盛。病為膈食便結。三焦相火不足。不能薰化水穀。病為溇瀉。蓋飲主化氣。食主化血。小腸所受盛者。只是食物而已。若水則從胃已散出。分走連膜。中醫以水入小腸。下至閘門。飛渡膀胱。故為西醫所笑。

臟腑合圖



心
肺
肝
胃
脾
胰
膽
腸
胃
肉

大腸
小腸
直腸
膀胱

手太陰肺經穴圖

中府 俠白
雲門 尺澤
天府 孔最

列缺 魚際
經渠 少商
太淵

肺經諸穴歌

手太陰肺十一穴中府雲門天府列俠白下尺澤孔最見列缺
經渠太淵下魚際抵指少商如並葉



手太陰肺經考正穴法 由胸走手計十一穴

中府 一名膚俞。雲門下一寸六分。乳上三肋間。動脈應

手陷中。針三分。主腫脹。氣逆。唾涕等症。

雲門 巨骨下。使氣戶旁二寸陷中。動脈應手。舉臂取之。

去胸中行各六寸。針三分。灸五壯。主傷寒。胸脇短氣。上
冲。心肺等症。

天府 腋下三寸。肘腕上五寸。動脈中。禁灸。針四分。主暴
痺。鼻衄。中風。鬼語等症。

使白 天府下。去肘五寸。動脈中。針三分。灸五壯。主心痛
短氣。乾嘔煩滿。

尺澤 肘中約紋上。動脈中。屈肘橫紋。筋骨罅陷中。針三
分。灸五壯。主寒熱氣喘。心煩腹脹。小兒慢驚。

孔最。去腕上七寸。側取之。灸五壯。針三分。主熱病。汗不出。欬逆。吐血。失音。

列缺。去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。兩筋

骨解。針二分。主偏風。口面喎斜。中風半身不遂。

經渠。寸口動脈中。針二分。禁灸。主胸脹上逆。寒熱。

太淵。一名大泉。避唐祖諱。掌後內側。橫紋頭動脈中。灸

三壯。針二分。主胸逆煩悶。肺脹上逆。吐血。

魚際。大指本節後內側。白肉際陷中。針二分。禁灸。主身

熱。頭痛。衄血。


少商。大指內側。去爪甲角如薤葉。宜三稜針刺之。微出

血。泄諸臟熱。治喉中閉塞。心煩腹滿。唐刺史成君綽忽

領腫如斗。喉塞。甄權以三稜針刺之。微出血。立愈。

太陰肺臟圖

喉頭
氣管
血管
氣支管
左肺
右肺



手太陰肺經主治

肺主氣。西方庚中金也。其色白。形如華蓋。居諸臟之上。呼吸司之。嬌嫩異常。性畏熱燥。遇寒則欬。眼白及右頰。鼻孔皆其分野。肺氣之衰旺。關乎壽元之短長。然亦恃腎水充足。不使虛火鑠金。尚能保重清甯之體。可以永享大年。肺有裏症。有表症。肺主皮毛。邪在表。則右寸脉浮。症多發熱。肺理閉也。以噴嚏鼻塞。肺受邪以二陳咳。無痰者。為邪濕也。嗽有聲有痰。液所化。畏風。邪在皮毛。結使前胡湯。主之。嗽也。止咳散。主之。化。畏風。邪在皮毛。主胸滿痛。味日結。湯主之。加喉痛。甘桔湯主之。內。加味鼻燥。邪化火而液乾也。肺虛右寸脉細。症為自汗。氣虛表不固。八珍湯加黃芪。北五味。參。冬。主之。咳嗽。肺虛不甯。五味異功散主之。氣急。金不生水。虛火上炎。

知八味 咯血陰虛動火四生丸或肺痿大刑金而葉
焦五痿湯加天冬百合主之虛勞吐血而成歸脾湯

六味地黃湯

肺寔之症右寸脈有力症如氣閉塞而滿悶加味甘桔

頑痰閉塞清肺湯暑邪中肺主煩渴消暑九加杏仁水閉

發喘胃經蓄水腫侵於肺五皮飲大鬱而肺喘脹白虎湯加

桑皮等咽痛閉作火加味甘桔右脇痛肝移邪於肺氣

散主肺癰痛吐痰腥臭主之

肺寒之症外感居多脉右寸遲其症為清涕二陳湯加

咳嗽畏寒止嗽散面色痿白寒傷正氣六君子湯

肺熱之症右寸脉數症多目赤濁白散加黃芩鼻衄根

湯主咽痛火通咽道加味甘桔吐血火動四生散犀角

手太陰肺主治 肺經藥條

咳嗽濃痰火刑金而灼肺液黃芩知母湯主之酒積鼻赤鼻瘡

濕熱內蒸黃芩清肺飲主之龜胸肺熱脹白虎湯主之大燄金小

便不利黃芩清肺飲主之便血肺氣虛弱大腸下陷芍藥甘草湯加

黃芩丹皮生地主之

肺部藥隊

補肺猛將 黃芪 人參

補肺次將 黨參 沙參 百合 燕窩 阿膠 訶子

懷山藥 麥冬 冰糖

瀉肺猛將 葶藶 麻黃 桔梗 升麻 膽星 百部

白芥子

瀉肺次將 蘇子 牛蒡 杏仁 前胡 紫苑 僵蠶

桑白皮 竹茹 貝母

涼肺猛將	石膏	黃芩	竹瀝	馬兜鈴	山如姑
涼肺次將	洋參	元參	山梔	花粉	天冬
地骨皮	麥冬	薄荷	海石		
溫肺猛將	麻黃	天南星	北五味		
溫肺次將	蘇梗	款冬花	梨牛夏	生薑	

手陽明大腸經穴圖

天髎
迎香
扶突
天鼎

五里
肩髃
巨髃
臂臑

上廉
三里
曲池
肘髎
下廉
合谷



手陽明太腸經考正穴法 由手走頭二十穴

商陽 手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三壯針一分主胸中氣滿耳聾口乾目盲

二間 食指本節前內側陷中針三分灸三壯主喉痺頰腫鼻衄口乾

三間 食指本節後內側陷中針三分灸三壯主喉梗胸滿腸鳴口乾唇焦

合谷 手大指次指歧骨間陷中針三分灸三壯主傷寒大渴脈浮在表偏正頭痛腰痛

陽谿 腕中上側兩筋間陷中針三分灸三壯主狂言喜笑熱病目病耳鳴

偏歷 腕中後三寸針三分灸三壯主肩膊肘腕痛喉症

目疾鼻衄。

溫溜。腕後大士五寸。小士六寸。針三分。灸三壯。主腸鳴。腹痛。肢腫。吐舌。喉痛。

下廉。輔骨下。去上廉一寸。輔筋內分外。針五分。灸三壯。主腹脹。便血。食積。偏風。

上廉。三里下一寸。斜針五分。灸五壯。主小便赤。胸痛。偏風。偏正頭風。

三里。曲池下二寸。按之肉起。銳肉之端。灸三壯。針二分。主霍亂。遺矢。失音。頰腫。中風。手足不隨。

曲池。肘外輔骨。屈肘橫紋頭。陷中。以手拱胸取之。針五分。灸三壯。主風麻木不仁。臂痛。筋緩不伸。婦人經水不調等症。

肘髃 大骨外廉陷中灸三壯針三分主手臂風痛不仁
五里 肘上三寸行向裏大脈中央灸十壯禁針主風勞
四肢痛不可伸氣脹目視昏昏

臂臑 肘上七寸腠肉端肩髃下一寸兩筋兩骨罅陷
宛中舉臂取之灸三壯針三分主寒熱臂痛不伸

肩髃 膊骨頭肩端上兩骨罅中陷中宛宛中舉臂取之
有空灸七壯針六分主中風身體麻木不仁唐魯州刺
史庫狄嶽風痺不能開弓甄權針此穴即可射

巨骨 肩尖端上行兩大骨罅間陷中灸五壯針一寸半
主肩臂痛胸中瘀血

天鼎 頸缺盆上直扶突後一寸灸三壯針三分主喉痛
氣硬

扶突一名水穴。氣舍上一寸五分。在頸當曲頸下一寸。人迎後一寸五分。仰而取之。灸三壯。針三分。喉痛咳嗽氣上。

禾髻。鼻孔下。俠水溝旁五分。針三分。禁灸。主尸厥及口不開。一切鼻病。


迎香。鼻下孔旁五分。針三分。禁灸。主鼻塞不開。不聞香臭。偏風口喎斜。喘息不利。鼻中息肉。

大腸諸穴歌

手陽明經穴名，從口鼻，行三間，而行歷合谷，陽明之府，過肺，此經漸之清，下廉上廉三里，而通海，此其經五里之程，肩髃肩髃上，此其經大腸行，手少陰，此其經也，迎者事也。

大腸圖

大腸門 關門
小腸 直腸
上回 大腸
中回
下回



手陽明大腸經主治

大腸為傳道之官。與太陰肺經相表裏。故肺虛則大腸若墜。而氣為下陷。腸液少。則肺亦焦燥。而鼻竅為之乾。上接小腸。下通穀道。為諸臟泄氣之門。啟閉失職。諸臟受困。

大腸無表症。皆屬於裏。

大腸虛。氣虛也。右尺脈沉弱。症為氣血不足。脫肛下陷。

補中益氣湯 赤白久痢。歸脾湯 十全大補湯。補中

大腸實者。胃移熱也。脈右尺洪實。症如實大便閉。小承

腸胃不清。而生臟毒。下如魚腸。如豆汁者。芍藥甘草 燥

渴發狂。屎燥不出。小承氣湯 陽癰當臍而痛。溺數如淋。

十全壯丹

大腸寒積。右尺脈沉遲。症多久痢。腹痛積寒在臟。鴛鴦

子色

在之便血肢冷喜熱寒在腸也。加用子理中湯
 大腸熱肺臟移熱居多。右尺與右寸脈數。症如便血口
 燥唇焦。芍藥甘草湯加腸風下血。風邪乘之。腹多不痛。
 清魂散。黃芩升皮生地脫肛腫痛。三黃解毒湯加
 主之。如母荷葉主之

大腸部藥隊

補大腸猛將 淫羊藿 栗壳

補大腸次將 訂子肉 百合

瀉大腸猛將 大黃 桃仁 雷丸 麻仁 升麻

瀉大腸次將 秦光 旋覆花 郁李仁 杏仁 白芷

大腹皮 梨汁

涼大腸猛將 黃芩 黃柏

涼大腸次將 地榆 槐實 知母 連翹

溫大腸猛將

胡椒

破故紙

枸杞

溫大腸次將

當歸

足陽明胃經



足陽明胃經考正穴法 由頭走足四十五穴

頭維 額角入髮際。本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。

針三分。禁灸。主頭痛如破。目痛。

下關 客主人下。耳前動脈下廉。合口有空。開口則閉。側

卧閉口取之。針四分。禁灸。主耳有濃汁。口目喎邪。牙腫。

以三棱針出血。多含鹽湯。可不畏風。

頰車 耳下八分。曲頰端。近前陷中。側卧開口有空。取之。

針四分。灸七壯。炷如麥。主中風口噤。失音。牙痛。項強。

承泣 目下七分。直瞳子陷中。禁針灸。

四白 目下一寸。直瞳子。令病人正視取之。針三分。灸七

壯。主頭痛目眩。

巨髎 俠鼻孔旁八分。直瞳子。平水溝。針三分。灸七壯。主

面腫一切目疾。

地倉 俠口吻旁四寸。針三分灸二七壯炷莫大主偏風
口眼喎斜

大迎 曲頰前一寸二分。骨陷中動脈。又以口下當兩肩
是穴。針三分灸三壯。主風口頰腫硬目痛不開。

人迎 夾結喉兩旁一寸五分。仰而取之。昔左叔和以左
右手寸口為人迎。禁針。主吐逆霍亂胸滿咽腫瘰癧。
水突 頸大筋前直人迎下。氣舍上。針三分灸三壯。主氣
上咳逆喉腫氣短促難卧。

氣舍 頸直人迎下。俠天突陷中。灸三壯。針三分。主欬逆
項硬咽腫不消癭瘤。

缺盆 肩下橫骨陷中。灸三壯。針三分。不宜深。主息奔胸

滿水腫喉痺。

氣戶 巨骨下。俞府兩旁各二寸陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸三壯。主氣逆。喘咳喉癰。

庫房 氣戶下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸五壯。主氣逆。咳嗽胸滿。

屋翳 庫房下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主咳逆上氣。

乳根 乳中下一寸六分。陷中。去中行各四寸。仰而取之。針三分。灸五壯。主胸滿氣逆。噎病。乳痛。

不容 幽門旁。相去各一寸五分。去中行各三寸。灸五壯。針五分。主腹滿吐血。肩脇痛。口乾。

承滿 不容下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主腸

鳴腹脹。上氣喘逆。唾血。

膺窗 屋翳下一寸六分。陷中。去中行四寸。針四分。灸五

壯。主胸滿短氣。寒熱卧不安。

乳中 常乳中是。微刺三分。禁灸。主竅閉。汁不通。乳吹。

梁門 承滿下一寸。去中行各三寸。針三分。灸五壯。主脇

下積氣。食不運化。

關門 梁門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主腸

鳴。卒痛。泄利。不思飲食。

大乙 關門下一寸。去中行各三寸。針八分。灸壯。主心煩

癰疾。主之。

滑肉門 大乙下一寸。去中行各三寸。針八分。灸五壯。主

癰狂舌強。

夫樞。去脅俞一寸。俠臍中兩旁。各二寸。陷中。灸百壯。針五分。主氣逆水腫。

外陵。天樞下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主腹痛心懸。

大巨。外陵下一寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小腹痛。心懸。小便閉。

水道。大巨下三寸。去中行各二寸。灸五壯。針三分。主腰強。小腹脹。便閉。

歸來。水道下二寸。去中行各二寸。灸五壯。針五分。主小腹痛。七疝。婦人血臍積冷。

氣衝。歸來下一寸。去中行各二寸。灸七壯。炷如麥。禁針。主氣逆。腹滿。又能於吐血不愈。以三稜針刺出血。立愈。

脾關 伏兔後交文中針六分灸三壯主腰痛足麻木不

仁

伏兔 膝上六寸起肉坐而取之以左右各三指按捺上有肉起如兔之狀因以為名針五分禁灸主風氣腹脹風勞痺逆

陰市 膝上三寸伏兔下陷中拜而取之針三分禁灸主

腰脚寒腹脹痿痺不仁

梁邱 膝上二寸兩筋間灸三壯針三分主冷痺不仁乳

腫痛腰膝脚痛

犢鼻 膝膑下脂骨上俠解大筋陷中形如牛鼻故名針

三分灸三壯主膝痛不仁

三里 膝下三寸胫骨外廉大筋內宛宛中兩筋內分間

舉足取之灸三壯針五分主胃寒腹脹便閉氣逆有人年少氣弱常於三里氣海灸之節次約五七十壯至老不生熱厥頭痛雖大寒不畏

上廉三里下三寸兩筋骨罅中蹲地舉足取之針八分灸三壯主風痺喉痺偏風足痛

條口下廉上一寸舉足取之針五分灸三壯主足麻足寒濕痺胛腫

下廉上廉下三寸兩筋骨罅中蹲地舉足取之針八分灸三壯得氣即瀉偏風腿痿風濕痺喉痺傷寒狂言

豐隆外踝上八寸下胛外廉陷中針三分灸三壯主便閉風痰頭風癲狂

解谿衝陽後一寸五分腕上陷中足大指次指直上附

上陷者宛宛中。灸三壯。針五分。主風面浮腫。氣逆腹脹。頭風目痛。

衝陽 足跗上五寸。去陷谷二寸。骨間動脈。針三分。灸三壯。主偏風。口眼喎斜。腹堅大。

陷谷 足大指次指外間。本節後陷中。去內庭二寸。針三分。灸三壯。主面目浮腫水病。

內庭 足大指次指外間陷中。灸三壯。針三分。主四肢厥逆。腹脹咽痛。鼻衄不止。

厲兌 足大指次指之端。去爪甲角如韭葉。針一分。灸一壯。主尸厥。口噤氣絕。中惡。頸腫唇裂。

足陽明胃經主治

胃屬中土。受化穀食。經言得穀者昌。失穀者亡。其能受與否。生死係焉。其性與脾同。而畏木尅。舌之中及牙牀唇口。至於人中。皆其分野。色現黃。

胃為陽明。有經有腑。故有表症。右關脈浮。傷寒邪入陽

明。其症為目痛。邪熱動作。鼻乾唇焦。葛根湯主之若表症。面

浮腫而痛者。風也。葛根湯主之邪熱所化。癰疹者。葛根湯主之

胃虛唇必白。右關脈必軟弱。症多吐。土虛本侮也。六香砂

湯加柴噎膈。因胃脘乾槁。上脫槁。能飲水難食。下脫槁。

食之久而復出。故膈散主之佐以四君子。胃氣虛而難

食。六君子胃脘痛。心怔忡。喜按。歸脾湯。或四君子湯加

停滯不化。枳朮丸土不勝濕而腫。有砂六君土衰濕化

凡陽明月經主治

痰。六君子之氣促食少。五味異功

胃實。右關脈洪。按胸則痛。症多結胸。邪熱結聚也。大小

湯主。痞氣腹大如盤。厚朴中九加食積脹痛拒按。保和丸

痰咳則痛。小半夏加茯苓飲尤效。湯主。水腫胃經蓄水。或喘或

不喘。五皮飲胸脹痛積滯。保和丸胸脹蓄血。澤蘭湯胸

痛嘔膿胃脘癰也。不治自愈。胃不和卧不安。砂仁湯加

便閉發狂。胃有燥火。湯主之。

胃寒唇白。右關脈必沉遲。其症為脘痛。肢冷氣冷。湯加

肉桂如吐蛔加嘔吐者。砂仁胃散加煨薑。霍亂寒濕傷胃。

和胃飲吞酸寒不消食者。湯主之。

胃熱脣紅口臭。右關脈洪數。其症為三消。燥熱結聚口

渴消水為上消。二冬湯消穀易飢為中消。湯主之。

生地八物口

渴。小便如膏為下消。六味地黃湯。口燥唇焦。痰火為患。
 二陳湯加山。胃火迫血妄行。白虎湯。陽明有餘。少陰不
 足。齒痛者。玉女煎。黃胖面腫。濕熱者。和中丸。熱蒸自汗。
 抽薪飲。胃火熾甚。舌黑燥渴者。白虎湯。發癰疹大鬱而
 化者。初用葛根湯加牛茅以散之。次用犀角大青湯加
 胃火上衝。呃逆不止。安胃散。頭痛筋扛起。胃火上衝者。
 加味生麻。湯主之。

胃部藥隊

補胃猛將	白朮	黃耆	大棗
補胃次將	藕豆	山藥	龍圓
瀉胃猛將	枳實	雷丸	神麴
菜腹子		石菖蒲	白芥子
		紅棗	炙甘草

瀉胃次將 蘇梗 枳殼 蔓荊子 麥芽

涼胃猛將 石膏 犀角

涼胃次將 花柳 葛根 香薷 石斛 華解 知母

蘆根 竹葉

溫胃猛將 乾薑 高良薑 益智仁 肉豆蔻 草果

丁香 沉香 木香 胡椒 辛夷

溫胃次將 藿香 砂仁 白豆蔻 半夏 烏藥 煨

薑 厚朴 川椒



足大陰脾經考正穴法 由足走胸二十一穴

隱白 足大指端內側去爪甲角如韭葉針三分灸三壯

主腹脹喘滿衄血小兒慢驚

大都 足大指節後內側陷中骨縫赤白肉際針三分灸

三壯主熱病腹脹吐逆心痛

大白 足大指內側內踝前核骨下陷中針三分灸三壯

主身熱腹脹嘔吐食不化

公孫 足大指本節後一寸內踝前足太陰絡脈針四分

灸三壯主寒熱腹脹痛氣逆

商丘 足內踝骨下微前陷中前是中封後是照海居中

即是正穴灸三壯針三分主腹脹寒瘡疝氣黃胆

三陰交 內踝上三寸骨下陷中針三分灸三壯主脾胃

虛弱心腹脹滿此穴腎肝脾三脈交會。

漏谷 內踝上六寸。胛骨下陷中。針三分。禁灸。主腸鳴脹滿氣逆。

地機 膝下五寸。膝內側輔骨下陷中。伸足取之。灸三壯。針三分。主腰痛。腹脹。癥瘕。

陰陵泉 膝下內側輔骨下陷中。伸足取之。或屈膝取之。在膝橫紋頭下。與陽陵泉穴相對。稍高一寸。針五分。主陰痛。淋症。腹寒痛。

血海 膝膕上。內廉白肉際二寸半。針五分。灸三壯。主氣逆。腹脹。暴崩。

箕門 魚腹上越筋間。陰股內動脈應手。一云股上起筋處。灸三壯。主淋症。遺溺。

衝門

府舍下一寸。橫骨兩端。約中動脈。去腹中行各四

寸半。針七分。灸五壯。主腹寒氣滿。積聚。陰疝。

府舍

腹結下二寸。去腹中行各四寸半。灸五壯。針七分。

主疝瘕。痺中急疼。

腹結

大橫下一寸三分。去腹中行各四寸半。針七分。灸

五壯。主欬逆。腹寒痛。

大橫

腹哀下三寸五分。去腹中行各四寸半。針七分。灸

五壯。主風逆。四肢強硬。

腹哀

日月下一寸五分。去腹中行各四寸半。針三分。主

腸寒。便血。腹痛。

食噎

天谿下一寸六分。去胸中行各六寸。舉臂取之。針

四分。灸五壯。主胸滿。脇痛。

天谿 胸鄉下一寸六分陷中。去胸中行各六寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主胸滿氣逆。喉中作聲。

胸鄉 周榮下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。針四分。灸五壯。主胸滿背痛。

周榮 中府下一寸六分。去胸中行各六寸。仰而取之。針

四分。主胸滿欬逆。氣上。灸三壯。

大包 淵液下三寸。灸三壯。針三分。主胸中痛。氣喘。

脾經諸穴歌

足太陰脾中州，三十一穴隱白遊。脾大都兮臍太白，肱公孫兮內邱越。
三陰之交而滿谷，地機可接步陰後。之泉而血海，箕門是表入衝門兮。
府舍軒髁，脾腹結兮大橫後。游腹良，食竇兮接大氣而同脈。胸鄉周
榮兮，腹大氣而如狗。

脾

脾臟

圖

甜肉

足太陰脾經主治

脾屬土。中央戊己。其色黃。為後天之本。下受命門火。蒸化穀食。上輸穀食之液。灌溉臟腑。人生存活之原。脾土之功為最大。其性喜燥而惡濕。濕則土力衰。而木得以尅之。位列中焦。其分野在眼胞鼻準四肢。與陽明胃經相表裏。

脾無表症。皆屬於裏。

脾虛。右關脈細軟。病為嘔吐。寒濕中空。六君子湯加土

不勝濕泄瀉者。五味異功散氣虛下痢。補中益氣湯四肢軟

弱。散主之腫脹。補中益氣湯肌瘦。十全大氣虛鼓脹

六君子湯陽虛惡寒。附子理中湯表虛自汗。五味異功散土不勝

金而喘。五味異功散化穀無力積滯。六君子湯不勝

虛陷脫肛腸紅。補中益氣湯

脾寔右關脈洪寔其症為氣鬱發悶沉香降血積作痛

澤蘭食積堅滿大和痞積血滯和中蟲積濕熱所化唇

內有白點凡化疾飲咳痛決苓湯加中寔有物非蟲即

血凡和中中滯腹痛山查收芽厚朴

脾寒之症右關脈沉遲唇舌必白病如嘔吐食不消化

反胃平胃散泄瀉六君子白痢六君子腹痛香砂理中

身痛濕重香薷散或黃疸茵陳濕腫五苓肢冷附子

湯厥脫氣衰附子理中湯

脾熱之症右關脈數舌胎薄黃唇赤症如熱吐橘皮竹

連主之黃流涎腫中出沫黃芩芍洞泄如注四苓散加

瀉如蟹渤將變成痢黃芩赤痢傷血治痢奇方或

腹痛芍藥甘草湯目胞腫痛火上升柴胡酒濕積為瘕

病加味枳朮湯加酒濕生熱眩暈
黃花清 黃疸目溺皆

脾部藥隊

補脾猛將 黃精 白朮

補脾次將 山藥 扁豆 苡仁 大棗 炙甘草

瀉脾猛將 枳實 萊菔子

瀉脾次將 神曲 麥芽 山楂 枳壳 厚朴 白芷

大腹皮 使君子 雞內金 陳皮 檳榔

涼脾猛將 大黃 黃芩 瓜蘖霜

涼脾次將 黃柏 山梔 知母 銀花 武夷茶

溫脾猛將 附子 乾姜 巴豆 肉豆蔻 草果仁

蒼朮 胡椒

溫脾次將 木香 煨姜 烏藥 益智仁 焦穀芽
砂仁 白寇仁 蕪荑 川椒

手少陰心經

極泉
靈通
神門
少冲
青靈
通里
少府
少海
陰郛



手少陰心經考正穴法 由胸走手九穴

極泉 臂內腋下筋動脈入胸。針三分。灸七壯。主心痛。乾嘔煩渴。

青靈 肘上三寸。伸肘舉臂取之。灸三壯。主頭痛。臂不舉。少海 肘內廉節後大骨外。去肘端五分。屈肘向頭得之。針三分。灸三壯。主寒熱。半身不遂。項難回顧。

靈道 掌後一寸五分。針三分。灸三壯。主心痛。乾嘔。

通里 掌後一寸陷中。針三分。灸三壯。主鼻衄。心痛。頭痛。陰郄 掌後脈中。去腕五分。針三分。灸七壯。主鼻衄。心痛。霍亂胸滿。

神門 掌後悅骨端陷中。手少陰心脈所注。針三分。灸七壯。主瘧疾。心煩。喘逆。身熱吐血等症。

少府。手小指本節後骨縫陷中。針二分。灸七壯。主煩滿。
少氣。陰痛及遺尿偏墜。小便不利。
少衝。手小指內側。去爪甲角如韭葉。針一分。灸三壯。主
熱病。煩滿。胸痛。痰氣等症。

心經諸穴歌

手少陰九穴成極泉青靈
少海行自靈道通里而達通
陰郄神門而迎抵於少府少
衝可尋

心圖

大動脈 上下行大靜脈
肺動脈 上下行大靜脈
左心耳



手少陰心經主治

心屬火。其色赤。居胸下歧骨陷處。得血養之。能運慧思。用才智。為君主之官。

心無表症。皆屬於裏。

血不足則虛。左寸脈必弱。其症如驚悸。惕惕然。恐神失

所守。

七福飲

思慮過

夜不得卧

歸脾湯

安神心腎不

交。神明不充。健忘者。

歸脾湯

似饑似飢

喜手按摩虛

痛者。

洋參湯

氣自下逆

怔忡者

歸脾湯

遺精或夢或不

夢。心腎不固者。

清心丸

邪一入則實。所入之邪。多在包絡。左寸脈必弦大。其症

如氣滯。食脹。或怒冲煩悶而痛。

沉香降

血凝於中而痛

者。

手拈

乾嘔吐涎。傳飲作痛。

中夏加

茯苓痰迷壅閉不

省人事。

清熱

煎

暑閉汗喘昏悶。

清暑

九

灌之

再用

蘇

喘

者

者。飢時作痛。

面白

唇紅

凡

此

蟲

心之寒。

左寸脈遲

其症為暴痛

肢冷

氣冷

綿綿不休

附

桂

湯

主之

心

之熱

左寸脈數

舌尖赤

其症多目痛

連翹。

花

重舌

木舌者

凡

煩躁者

凡

加暑熱

乘

心不得卧者

益元散

加

癩狂者

生鐵

謔語邪熱攻心者

凡。

赤濁者

加

心丹

便血者

散

心部藥錄

北五味

補心猛將

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

茯神

補心猛將

北五味

補心次將

麥門冬

當歸

白芍

茯苓

瀉心	猛將	石菖蒲	黃連	木通	硃砂	犀角
瀉心	次將	山梔仁	連翹心	通草	車前子	燈心
竹捲心	蓮子心					

手太陽小腸經

天窠
天窠

腕骨
陽谷

少澤
前谷
後谿

顛髻

聽宮

曲池

肩髃

肩中髃

肩貞

臑俞

天宗

养老
支正
少海



手太陽小腸經考正穴法 由手走頭十九穴

少澤 手小指端外側。去爪甲角下一分。陷中。灸一壯。針

一分。主瘡寒熱。喉痺。舌強。口乾。項強。目翳。頭痛。

前谷 手小指外側。本節前陷中。針一分。灸一壯。主熱病

耳鳴。項腫。喉痺。鼻塞。咳血。

後谿 手小指外側。本節後陷中。握拳取之。針一分。灸一

壯。主寒熱。目赤。鼻衄。耳聾。項強。

腕骨 手外側腕前。起骨下陷中。針二分。灸三壯。主頭痛。

耳鳴。目翳。驚風。

陽谷 手外側腕中。銳骨下陷中。灸三壯。針二分。主癰疾。

頭腫。耳聾。齒痛。舌吐。目眩。

養老 手踝骨前上一分。腕骨後一寸。陷中。針三分。灸三

壯主肩臂痛

走正腕後五寸針三分灸三壯主風驚恐悲愁癲狂五

勞手臂強硬

肘外大骨外去肘端五分陷中屈手向頭取之針

二分灸三壯主肩臂痛寒熱齒腫耳聾目黃頰腫

肩貞曲胛下兩骨解間肩髃後陷中針五分灸三壯

傷寒耳病手足麻木

臑俞俠骨髃後大骨下脾上廉陷中舉臂取之針八分

灸三壯主肩臂痛氣腫

天宗東風後大骨下陷中灸三壯針五分主肩痛不能

伸舉肘後痛

陳風天髃外肩上下兩後舉臂有空灸五壯針五分主

肩痛不能舉。

曲垣 肩中央曲胛陷中。灸三壯。針五分。主肩痺熱痛。氣

注。肩胛拘急痛。

肩外俞 肩胛上廉。去脊三寸陷中。針五分。灸三壯。主肩

胛痛。

肩中俞 肩胛內廉。去脊二寸陷中。針六分。灸三壯。主咳

嗽。上氣唾血。寒熱目昏。

天窗 頸大筋間。前曲頰下。扶突後。動脈應手陷中。灸三

壯。針三分。主痔瘻。頸痛。中風。

天容 耳下曲頰後。針一寸。灸三壯。主喉痺咽硬。吐逆耳

聾鳴。

歡髎 面頰骨下廉。銳骨端陷中。針二分。主口喎斜。面赤。

眼動齒痛。

聽宮 耳中珠子大如赤小豆。針三分。灸三壯。主失音腹
滿耳鳴。

小腸諸穴歌

小腸穴十九，中路從少澤，步前谷，
後穀之隆，通達腕骨，觀陽谷，養老，
之索，行支正於小海，通肩貞，以相從，
循臑俞，兮過天宗，乘風兮曲垣，
中府外俞兮肩中俞，啟天窗兮見
天容，廉由顙髎，肩道聽宮。

上接胃口地門

下入大腸關門



小腸圖

手太陽小腸經主治

小腸者。受盛之官。化物出焉。其上口即胃。下口。水穀由此而入。下口即大腸上口。此處沁別清濁。俾水液滲膀胱。滓穢流入大腸。是腑中之有鑒別者。與少陰心相表裏。脈附左尺。

小腸無表症。皆屬於裏。

小腸虛。左尺脈細軟。其症為溺赤短。生地黃湯腰痛水不足者。六味地黃丸

小腸實。左尺脈洪弦。其症為下焦氣滯。臍下轉痛。橘核丸

陰陽拂逆。大小腸交。五苓散

小腸寒。左尺脈遲。其症為咳嗽。失氣。有所謂小腸寒嗽。

止嗽散加芍藥主治之

小腸熱。左尺脈數。其症為溺瀉溺短。濕熱壅滯。導赤散主之。

小腸部藥隊

補小腸猛將 生地

瀉小腸猛將 木通

瀉小腸次將 瞿麥 海金沙 川棟子 苡仁 赤芍

赤茯苓 燈草

足太陽膀胱經穴圖



足太陽膀胱經考正穴法由頭走足六十七穴

睛明

目內背頭外宛宛中。針一分半。主頭痛目疾。

攢竹

兩眉頭陷中。針一分。禁灸。主頭痛鼻塞一切目疾。

眉冲

直眉頭上神庭曲差之間。針三分。禁灸。主五癰頭

痛鼻塞

曲差

神庭旁一寸五分。入髮際。針二分。灸三壯。主目疾。

心煩

頭痛鼻塞煩熱。

五處

俠上星旁一寸五分。針三分。灸三壯。主脊強反折。

頭熱

目不明。

承光

五處後一寸五分。針三分。主風眩頭痛嘔吐心煩。

鼻塞

目翳。

通天

承光後一寸五分。針三分。灸三壯。主頭項難轉頭

痛鼻衄。

絡却 通天後一寸五分。灸三壯。主頭痛。目障。耳鳴。
玉枕 絡却後一寸五分。俠腦戶旁一寸三分。起肉枕骨
上。入髮際二寸。灸三壯。針三分。主目痛如脫。頭風痛不
可忍。鼻塞不聞。

天柱 俠項後髮際大筋外廉陷中。針五分。灸七壯。主足
弱。肩背欲折。頭腦痛。項強。

大杼 項後第一椎下兩旁。相去脊各一寸五分。陷中。正
坐取之。針五分。灸七壯。主頭目眩。腹痛。項強。

風門 二椎下兩旁。去脊各一寸五分。正坐取之。針五分。
灸五壯。主發背。氣喘。項強。目瞑。胸熱。卧不安。

肺俞 第三椎下兩旁。相去脊各一寸五分。針五分。灸三

壯。主瘦氣。黃疸勞瘵。口乾。項強。嘔吐。

厥陰俞 四椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針

三分。灸七壯。主欬逆。牙痛。心痛。胸滿。嘔吐。

心俞 五椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針三

分。灸五壯。主偏風。中風。鼻衄。目昏。心亂。

督俞 六椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。主寒

熱。腹痛。氣逆。灸三壯。

高俞 七椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針三

分。灸三壯。主心痛。翻胃。骨蒸腫脹。

肝俞 九椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針三

分。灸三壯。主氣逆。中風。目昏。欬逆。口乾。

膽俞 十椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針五

分灸三壯。主腹脹積聚黃疸。

脾俞 十一椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針

三分。灸三壯。主脹痛多食身瘦。痰瘕寒熱黃疸。

胃俞 十二椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。針

三分。灸三壯。主霍亂腹脹。翻胃嘔吐。

三焦俞 十三椎下兩旁。相去脊各一寸五分。正坐取之。

針五分。灸三壯。主積脹傷寒頭痛。

腎俞 十四椎下兩旁。相去脊各一寸五分。前與臍平。正

坐取之。針三分。灸三壯。主發傷寒頭痛。五勞七傷。瘦弱

面黃。

氣海俞 十五椎下兩旁。相去脊各一寸五分。主腰痛痔

漏。針三分。灸五壯。

大腸俞 十六椎兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主脊強難俛仰。腰腹脹痛。小腹絞痛。

關元俞 十七椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。主風勞腰痛。泄痢。虛脹。痼聚。

小腸俞 十八椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主津液少。便赤。腹脹。五痔。頭痛。虛乏。

膀胱俞 十九椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主急強。便黃。遺溺。拘急。泄利。腹痛。女子痼聚。

中膂俞 二十椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。針三分。灸三壯。主腎虛。腰強。腸冷。赤白痢。腹脹。

白環俞 二十一椎下兩旁相去脊各一寸五分。伏而取之。

之針五分。灸三壯。主手足不仁。腰痛。疝氣。

上髎 第一空腰髀下一寸。俠脊陷中。針三分。灸七壯。主便閉。嘔逆。大理。趙卿患偏風。不能起跪。甄權針上髎。環跳。陽陵泉。巨虛。下廉。即能起跪。

次髎 第二空俠脊陷中。針三分。灸七壯。主小便赤。腰痛。不仁。疝氣。下墜。偏風。婦人赤白帶下。

中髎 三空俠脊陷中。針二分。灸三壯。主便閉。腹脹。五勞七傷。婦人絕子。帶下。月信不調。

下髎 四空俠脊陷中。針二分。灸三壯。主大小便不利。大便下血。小腹急痛。

會陽 陰尾尻骨兩旁。針八分。灸五壯。主腹寒。熱。冷。隔氣。腸辟。下血。陽氣虛。久痔。

附分 二椎下附項內廉兩旁。相去脊各三寸。正坐取之。針三分。灸五壯。主風氣拘急不仁頸強。

魄戶 直附分下三椎下兩旁。相去脊各三寸。正坐取之。針五分。灸七壯。至百壯。主虛勞背痛。三尸走疰。項強喘急。嘔吐煩滿。

膏肓俞 四椎下一分。五椎上二分。兩旁相去脊各三寸。四肋三間。正坐取脊。伸兩手以臂着膝間。令端直。手大指與膝頭齊。以物支肘。毋令搖動。取之。灸百壯。至數百壯。主虛弱瘦損。上氣欬逆。晉侯疾。秦緩至。為病在膏下。肓上不可為也。孫思邈曰。專心求此穴。灸之。疾無不愈。神堂 五椎下兩旁。去脊各三寸。脇中。正坐取之。針三分。灸五壯。主背脊強急。胸滿氣逆。

噫嘻 肩膊內廉俠六椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。病人言噫嘻。噫嘻應手所按。針六分。灸二七壯。止百壯。主大風勞損。胸腹脹痛。目疾。鼻衄。喘逆。

鬲關 七椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。略開兩肩。針五分。灸三壯。主嘔噦。噎悶。胸背連痛。便赤黃。魂門 九椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。針五分。灸三壯。尸厥。食飲不下。腹鳴。便赤。

陽綱 十椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐。闊肩取之。針五分。灸三壯。主腸鳴。腹痛。便赤。身熱。怠惰。

意舍 十一椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針五分。灸五十壯。主腹脹。嘔吐。身熱。目黃。惡風寒。

胃倉 十二椎下。兩旁相去脊各三寸。正坐取之。針五分。

灸五十壯。主腹脹水腫。惡寒食阻背痛。

育門 十三椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。灸三十壯。針五分。主心痛。便堅。乳疾。

志室 十四椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。正坐取之。針九分。灸三壯。主陰腫痛。腰背強痛。脇痛。霍亂。

胞育 十九椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。伏而取之。針五分。灸五七壯。主腰脊急痛。腹堅。食不消。便閉。

秩邊 二十椎下。兩旁相去脊各三寸。陷中。伏而取之。針五分。灸三壯。主五痔發腫。便赤腰痛。

承扶 尻臀下。陰股上紋中。針七分。灸三壯。主腰脊相引如解。久痔。尻臀腫。便難。陰胞有寒。

殷門 浮郤下三寸。針七分。主腰脊不可俛仰。惡血泄注。

外股腫

浮却

安陽上一寸。展膝得之。針五分。灸三壯。主霍亂轉

筋。小便熱。大便堅。

安陽

承扶下六寸。針七分。灸三壯。主腋腫痛。筋急身

熱。痿厥不仁。

安中

臍中央。約紋動脈陷中。針八分。禁灸。主膝痛。腰重。

俠脊。沉沉然。傷寒四肢熱。汗不出。

合陽

約紋下三寸。針六分。灸五壯。主腰強。腹痛。寒疝。女

子崩中帶下。

承筋

腓腸中央陷中。脛後從腳跟上七寸。灸三壯。禁針。

主腰強。脛痺不仁。痔瘡。霍亂。

承山

銳腓腸下分肉間陷中。灸五壯。針七分。主便閉。痔

腫霍亂傷寒水結

飛揚 外踝骨上七寸。灸三壯。針三分。主痔痛。脚痠腫。風逆癰疾。足指不得屈伸。

附陽 外踝上三寸。針五分。灸三壯。主霍亂頭痛。時有寒熱。四肢不舉。風痺。

崑崙 足外踝後五分。跟骨上陷中。細脈動應手。針三分。灸三壯。主脚氣踝裂。肩背拘急。喘滿。目痛。

僕參 足跟骨下陷中。拱足取之。針三分。灸七壯。主霍亂吐逆。狂言。脚膝氣腫。

申脈 外踝下五分。陷中。容爪甲。白肉際。前後有筋。上有踝骨。下有軟骨。其穴居中。針三分。灸三壯。主風眩。勞極。冷氣上逆。腰脚痛。

金門 外踝下少後邱墟後申脈前針一分灸三壯主霍亂暴病身戰不耐久立

京骨 足外側大骨下赤白肉際陷中按而得之小指本節後大骨名京骨穴在骨下針三分灸七壯主頭痛如破腰痛不可屈伸身後側痛目赤爛寒熱發瘡項極

束骨 足小指外側本節後赤白肉際陷中灸三壯針三分主頭痛目疾瘡癰腰痛

通谷 足小指外側本節前陷中針二分灸三壯主頭痛目疾

至陰 足小指外側去爪甲角如韭葉針二分灸三壯主目疾鼻塞頭痛寒瘡

膀胱諸穴歌

足太陽三十六。精明攢竹。諸曲差五處之鄉。承光通天。
見絡却玉枕之行。天柱高兮大杼低。風門開兮肺俞當。
厥陰心膈之俞。肝膽脾胃之臟。三焦腎兮大腸小腸。膀
胱俞兮中膂白環。自從大杼至此。去脊中寸半之旁。又
有上次中下四髻。在腰四空以相將。會陽居尻尾之側。
始了背中。二行仍上肩胛而下。附分二椎之旁。三椎魄
戶。四椎膏肓。神堂噫嘻兮高關。魂門兮陽綱。意舍兮胃
倉。育門志室。秩邊胞肓。承扶浮郤與委陽。殷門委中而
合陽。承筋承山到飛揚。輔陽崑崙至僕參。中脈金門。探
京骨之場。束骨通谷。抵至陰小指之旁。

男女生殖器官圖

男陰全部直截圖

- 1 膀胱
- 2 皮膚
- 3 恥骨
- 4 尿道口
- 5 陰囊
- 6 龜頭
- 7 包皮
- 8 尿道
- 9 海綿體
- 10 海綿體
- 11 攝精管
- 12 射精管
- 13 底部
- 14 精囊
- 15 輸精管
- 16 陰囊

女陰全部直截圖



陽精論

精者。血脈所生。液之精奇者也。以顯微鏡照驗。見精內有活物甚多。狀如蝌蚪而長尾。游行甚疾。一日尚生。禽獸衆類亦然。但形差別耳。男子未成丁之前。血不生精。丁年以後。赤血運行至外腎。即由微絲管攝入衆精管。漸運而出。至卯蒂。滙入總管。循行至膀胱之底。藏聚於精囊之內。俟交媾時到。乃由精囊洩出。夫精者。化生甚難。耗失極易。少年血氣未定。百體未堅。若縱情恣慾。輕則有虛勞之憂。重則有夭折之患。戒之在色。養身莫善於寡慾也。若手淫自洩。傷身更甚。每有青盲聾情之症。至於擁妓宿娼。花柳之害尤酷。傷殘身體。毒及妻孥。不知自愛者。誰為惜之。

陰經論

女子尻骨盤內。前為膀胱。中為子宮。後為直腸。膀胱溺管。長約一寸。其下為陰道。口為陰戶。內寬外狹。童女有薄膜。捫閉。膜有小缺。通流月水。初與男子交合。膜破。微有血出。俗名破身。及生子。則有產門也。形如直腸。肉理橫生。可寬可窄。內有摺皮。外有連膜。其底嚙接子宮之口。陰水生焉。子宮者。狀如葫蘆上截。倒掛骨盆之內。長二寸。底濶一寸三分。厚七分。內空為三角房。一角在口。兩角在底。分左右。底角有小孔。可通猪毛。底之外有兩筋帶懸之一圓一扁。圓筋繫於交骨。扁筋即大小腸夾膜。與胯骨粘連。若筋帶無力。或產後行動。即有子宮下墜之憂。凡未嫁童女。子宮之口。小如目瞳。共重八錢。懷孕之後。積月漸大。妊胎三月。

漸長四寸。妊胎五月。底圓如霧。妊胎七月。脹至臍上。漸長六寸。妊胎九月。直至胸下。長尺有零。重四兩。圓如西瓜。生子之後。腹縮而小。重只二兩而已。子宮之底。左右各出子管一支。與底角之孔通連。長二寸五分。管尾略闊。披展如絲。不即不離。垂於子核之側。子核者。在子宮左右。約離一寸。向內有蒂。與子宮相連。向外有筋帶。與子管相繫。形如雀卵。薄膜覆之。內有精珠十五顆。至十八顆不等。其質甚薄。剖而看之。內貯清水。是為陰精。女子受胎之年。精珠始生。暮年月信止。精珠化為烏有。凡夫婦交媾。男精洩入子宮。透於子管。子管即單護子核。子核感動。精珠迸裂。陰精與陽精交會。自子管之尾而入。在管內漸結薄衣。為胚珠。是為成孕。由是預生新膜。又生膠粒。塞子宮。是謂受胎。

足太陽膀胱經主治

膀胱為州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。亦必待腎氣充足則化。不足則不化。入氣不化。則水歸大腸而為泄瀉。出氣不化。則閉塞下焦為癰腫。故小便之利。主在膀胱。其實在腎氣主之也。凡傷寒有傳於各經之邪。多從膀胱而入。初起太陽頭痛等症。急宜發散。不使邪氣深入諸經為害。可知膀胱為入邪之第一關津。

膀胱為太陽之腑。自有表症。左尺脈浮軟。其症為頭痛。從腦而連項脊。加味香薷散。身痛四肢拘急。風傷衛。寒傷營者。桂枝湯。理閉塞發熱者。表麻黃喘嗽寒邪客於皮毛。肺氣不得升降。麻黃湯。

膀胱經虛。腎氣不化。左尺脈沉細。其症為小便不禁。氣

虛不能統攝。補十生大勞力辛苦。氣虛不化。為勞淋者。中補

溢氣。色慾動心。精不出而內敗。大小便牽痛而為淋者。

耳前分清飲去黃柏加虎絲連肉以去其精再服六味地黃丸。

膀胱實。左尺脈洪大。其症為氣淋。氣滯水道阻塞。臍下

脹痛。假蘇散血淋。蓄瘀中割痛難忍。紅生地四物湯加

石王。溺閉吐逆。假蘇散氣結膀胱。少腹熱。溺於小便。名曰

胞痺。補核

膀胱寒。左尺脈沉遲。其症為冷淋。寒氣堅閉水道。四肢

寒冷。金匱腎氣

膀胱熱。左尺脈數。其症為小便不通。口渴。則熱在上焦。

四苓散加不渴則熱在下焦。滋腎膏淋者。滴液如膏也。

山乾黃芩

清飲分石淋者下如沙石也益元氣便膿血者心氣遺

熱於膀胱也阿膠發狂者傷寒熱結膀胱下焦蓄血少

腹硬滿也調胃承氣湯主之

膀胱部藥隊

補膀胱即補腎之藥。腎氣化則小便自行。

瀉膀胱猛將 羌活 麻黃 防己 木通 葶藶

猪苓

瀉膀胱次將 獨活 防風 蒲黃 川棟子 前胡

藥本 澤瀉 蔥

涼膀胱猛將 甘遂 龍膽草

涼膀胱次將 茵陳 車前子 海金沙 川黃柏

溫膀胱猛將 吳茱萸

溫膀胱次將 烏藥 茴香

足少陰腎經穴圖

通谷 四滿 築賓 水泉 太谿
 幽門 中注 陰谷 照海 大鍾
 步廊 肩髃 橫骨 復溜
 神封 胃脘 大赫 交信
 靈道 石門 氣穴
 神藏 陰都
 或中
 命府



涌泉
 然谷

足少陰腎經考正穴法 由足走頭二十七穴

湧泉 足心陷中。屈足捲指宛宛中。白肉際。跪取之。針五分。勿出血。灸三壯。主尸厥。吐血。氣逆。心腹。痛。咽喉。閉。痛。舌急。漢。濟。北。王。母。熱。厥。足。熱。滿。于。意。刺。足。心。立。愈。

然谷 足內踝前起大骨下陷中。灸三壯。針三分。主咽喉。閉。痛。心痛。盜汗。泄精。陰。瘡。口。噤。

太谿 足內踝後五分。跟骨上動脈陷中。凡男女病有此。脈。則。生。無。則。死。針。三。分。灸。五。壯。主。久。瘡。心。痛。至。腹。痛。手。足。冷。

大鍾 足跟後踵中。大骨上。兩筋間。灸三壯。針二分。主嘔。吐。腹。滿。胸。脹。氣。逆。口。熱。舌。乾。

水泉 太谿下一寸。內踝下少陰郄。灸五壯。針四分。主目。

不能遠視月信不來腹痛

照海 足內踝下四分前後有筋上有踝骨下有軟骨其

穴居中針三分灸七壯主咽乾久瘡煩悶嘔吐大風

復溜 足內踝上二寸筋骨陷中前傍骨是復溜後傍骨

是交信二穴止隔一條筋針三分灸五壯主腸癰腹脹

如鼓四肢腫五種水病血痔便熱盜汗

交信 足內踝骨上二寸針四分灸三壯主氣淋疝氣疝

疾便淋女子漏血不止

築賓 內踝上端分中針三分灸五壯主癰疽胎疝吐舌

嘔吐

陰谷 膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝得之

針四分灸三壯主膝痛如錐舌縱涎下煩逆陰痛

橫骨 大赫下一寸。陰上橫骨中。宛曲如仰月。中央去腹

中行各一寸。灸三壯。禁針。主五淋。便閉。目赤痛。

大赫 氣穴下一寸。去腹中行各一寸。灸五壯。針三分。主

虛勞。失精。陰縮。莖痛。目赤。婦人赤帶。

氣穴 一名胞門。一名子戶。四滿下一寸。去腹中行各一

寸。灸五壯。針三分。主氣上下。腰痛。泄利。

四滿 中注下一寸。去腹中行各一寸。針三分。灸三壯。主

積聚。疝瘕。目赤。月水不調。惡血攻痛。

中注 盲俞下一寸。去腹中行各一寸。針三分。灸三壯。主

小腹有熱。大便堅燥。目赤。腰痛。

盲俞 商曲下一寸。去腹中行各一寸。針一寸。灸五壯。主

腹熱。便閉。腰痛。目赤。女子月事不調。

商曲 石關下一寸去腹中行各一寸五分針一寸灸五壯主腹痛積聚目赤

石關 陰都下一寸去腹中行各一寸五分針一分灸三壯主身寒熱瘡病心煩氣逆熱病目赤痛婦人無子藏有惡血

陰都 通谷下一寸去腹中行各一寸五分針三分灸三壯主寒熱瘡疾氣逆肺脹腸鳴目赤

通谷 幽門下一寸去腹中行各一寸五分針五分灸五壯主口喎斜胸滿心恍目赤

幽門 俠巨關兩旁各一寸五分陷中針五分灸五壯主腹脹嘔吐心煩泄利膿血目赤

步廊 神封下一寸六分陷中去胸中行各二寸仰而取

之針三分灸五壯主胸脇支滿咳逆鼻塞

神封 靈墟下一寸六分陷中。去胸中行各二寸。仰而取

之針三分灸五壯主胸滿不得息咳逆嘔吐

靈墟 神藏下一寸六分陷中。去胸中行各二寸。仰而取

之針三分灸五壯主胸滿嘔吐欬逆

神藏 或中下一寸六分陷中。去胸中行各二寸。仰而取

之針三分灸五壯主嘔吐欬逆胸滿

或中 俞府下一寸六分。去胸中行各二寸。仰而取之。針

四分灸五壯主欬逆胸脇支滿涎出多唾


俞府 氣舍下璇璣旁各二寸陷中。仰而取之。針三分灸

五壯主欬逆上氣嘔吐腹脹不下食飲胸痛久喘

腎經諸穴歌

足少陰兮七湧泉流於然谷太谿太僕兮水泉縛照海復溜兮交信
縛從築室兮上陰谷據橫骨兮大卦然氣穴四滿兮中注育俞通於
商曲兮石關兮陰都崑崙通谷兮幽門肅步廊神封而靈墟存神
滿哉中而俞府是

內腎圖



血脈管
回血管
尿管

足少陰腎經主治

腎為天一之水。先天之本也。位居壬癸北方。其色黑。體常虛。中有為命門相火。腎水充足。自多誕育。勿喪其本。則年高康健。腫神下頰。兩腰皆其部屬。

腎無表症。皆屬於裏。

腎水虛。厥左右尺當細軟。其症為頭痛。血不能充髓海。

六味地血虛火旺耳鳴。六味地黃丸加牛膝地黃丸加母虛閉耳聾。六味地黃丸加牛膝地黃丸加母

人參石菖蒲虛熱盜汗。人參石菖蒲加黃耆北五珍湯虛火夜熱。人參石菖蒲加黃耆北五珍湯

丹皮地骨皮心腎不交健忘者。丹皮地骨皮加黃耆北五珍湯虛火鏹金咳嗽。

者。白蜜胡素加水虧火炎氣喘者。白蜜胡素加水血虛吐血者。白蜜胡素加水

湯水虛腰痛者。杜仲川斷加腿痠足軟者。杜仲川斷加目視無光。

者。水不足也。六味地黃丸血虛液枯。大便燥結。六味地黃丸

腎氣不約。小便不禁。補久痢久瘡。脾腎兩虛。王

腎無實症。

腎之寒。腎虛也。脈左右尺必遲沉。其症為命門大衰。虛

象百出。左歸飲。虛火微。不欲飲食。八味地。腎虛泄瀉。

加味。上天柱骨倒。腎脈空也。右歸。倦卧厥冷。腎大衰也。

神凡。右歸飲。理中湯。

腎之熱。水將涸也。脈左右尺必沉數。或浮而空。舌黑無

液。其症為口燥咽乾。大承。目不明。無血養者。知柏。小

便不利者。水少也。滋腎。小便濁者。濕熱結於下焦也。鮮

分清。小便出血者。腎水熱也。生地。黃湯。大便秘者。液涸也。承

氣湯。主之。

腎部藥隊

補腎猛將

熟地

枸杞

淫羊藿

北五味

補腎次將

生地

巴戟天

首烏

杜仲

龜板

女貞

楮豆皮

海參

瀉腎猛將

猪苓

瀉腎次將

澤瀉

知母

赤苓

苡仁

涼腎猛將

朴硝

苦參

元明粉

涼腎次將

生地

丹皮

知母

滑石

溫腎猛將

破故紙

鹿茸

鹿角膠

溫腎次將

山茱萸

兔絲子

大茴香

艾葉

